



Difteria, Tétanos y Tos Ferina

Es una vacuna de refuerzo que protege contra el tétanos, la difteria y la tos ferina.



Indicaciones:

- Aplicación a Personas de 10 años en adelante.
- También se recomienda para la inmunización durante el tercer trimestre del embarazo para prevenir la tos ferina en los bebés menores de 2 meses.

Esquema:

- Dosis única de 0.5 ml.
- Recomendada cada 10 años para adultos



7ma ave 7-21
zona 1 Huehuetenango



Tel: 3404-9600

Vacuna contra La Fiebre amarilla

Es esencial para viajeros a zonas endémicas. Se recomienda para personas de 9 meses en adelante. La vacuna se administra en una dosis única y proporciona protección inmediata.



Indicaciones:

Es importante vacunarse al menos 10 días antes de viajar a áreas donde la fiebre amarilla es común.

Esquema: Su aplicación es de Dosis Única



7ma ave 7-21
zona 1 Huehuetenango



Tel: 3404-9600

Vacuna de Fiebre Tifoidea

La Vacuna de Fiebre Tifoidea sirve para prevenir la Enfermedad Fiebre Tifoidea que es una enfermedad infecciosa grave causada por la bacteria Salmonella Typhi. Si no se trata, puede ser mortal hasta en el 30% de los casos.



Indicaciones:

- Personas que viajan a lugares donde la fiebre tifoidea es común.
- Personas en contacto directo con portadores de la enfermedad.
- Trabajadores en laboratorios que manejan Salmonella Typhi.

Esquema:

- Una dosis I.M.
- A partir de los 2 años de edad
- Vacunar cada 2 años si se mantiene el riesgo



7ma ave 7-21
zona 1 Huehuetenango



Tel: 3404-9600

Vacuna contra la Hepatitis "A"

La vacuna contra la Hepatitis A protege contra el virus de la hepatitis A, que causa una enfermedad hepática grave.



Indicaciones:

- Personas que viajan o viven en zonas endémicas.
- Trabajadores expuestos ocupacionalmente.
- Personas con relaciones sexuales entre hombres.
- Personas que usan drogas inyectadas o no inyectadas.
- Personas sin hogar. Personas con VIH o enfermedad hepática crónica

Esquema:

- Niños: Dos dosis. La primera entre los 12 y 23 meses de edad, y la segunda al menos 6 meses después.
- Adultos: Dos dosis espaciadas en 6 meses



7ma ave 7-21
zona 1 Huehuetenango



Tel: 3404-9600

Vacuna contra el Virus de la Hepatitis "B" (Pediátrica)

Protege contra la infección por el virus de la hepatitis B, que puede causar enfermedad hepática grave. Se recomienda para todos los recién nacidos y es obligatoria en muchos países.



Indicaciones:

- Niñas y mujeres de 9 a 26 años
- Niños de 9 a 15 años

Esquema: Tres dosis:

- La primera dosis al nacer.
- Segunda dosis 1 – 2 meses después de la primera
- Tercera dosis 6 a 18 meses de edad



7ma ave 7-21
zona 1 Huehuetenango



Tel: 3404-9600

Vacuna contra el Virus de la Hepatitis "B" (Adulto)

La vacuna contra la Hepatitis B protege contra el virus de la hepatitis B, que puede causar infecciones hepáticas crónicas y cáncer de hígado.



Indicaciones:

- Personas con un estilo de vida sexual activo.
- Trabajadores expuestos a sangre o líquidos corporales.
- Personas que usan drogas inyectadas

Esquema: Tres dosis:

- La primera dosis
- Segunda dosis 1 mes después de la primera
- Tercera dosis 6 meses después de la primera



7ma ave 7-21
zona 1 Huehuetenango



Tel: 3404-9600

Vacuna Shingrix

Es una vacuna recombinante para la prevención del Herpes Zóster (culebrilla).



Indicaciones:

- Adultos de 50 años y mas.
- Adultos mayores de 19 años inmunodeprimidos

Esquema:

Dos dosis, separadas por 2 a 6 meses, I.M.



7ma ave 7-21
zona 1 Huehuetenango



Tel: 3404-9600

Vacuna Hexavalente

Vacuna que protege contra 6 enfermedades: tétanos, difteria, tos ferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenza tipo b.



Indicaciones:

- Niños: Desde las 6 semanas hasta los 4 años de edad.
- Personas en riesgo: Trabajadores de la salud y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Esquema:

- Primera dosis: A las 6 semanas de edad.
- Segunda dosis: A las 8 semanas de edad (al menos 4 semanas después de la primera dosis).
- Tercera dosis: A los 11 meses de edad (al menos 8 semanas después de la segunda dosis).
- Dosis de refuerzo: A los 12 – 23 meses de edad.




7ma ave 7-21
zona 1 Huehuetenango



Tel: 3404-9600

Vacuna Antigripal

Es una vacuna anual que protege contra el virus de la gripe. Debido a la alta mutabilidad del virus, la vacuna se actualiza cada año para incluir las cepas más prevalentes.



Indicaciones:

- Trabajadores de la salud y cuidadores de personas vulnerables,
- Personas mayores de 6 meses
- Personas mayores de 65 años,
- Personas con enfermedades crónicas como asma, diabetes o enfermedades cardíacas
- Embarazadas.

Esquema:

- Se recomienda una dosis anual.
- Para niños entre 6 meses y 8 años, puede ser necesaria una segunda dosis durante la misma temporada de gripe.



7ma ave 7-21
zona 1 Huehuetenango



Tel: 3404-9600

Vacuna Menactra

Es una vacuna conjugada meningocócica que protege contra las infecciones causadas por meningococo. Ayuda al cuerpo a desarrollar inmunidad contra la meningitis, una infección bacteriana que puede ser mortal o causar problemas médicos permanentes e incapacitantes.

Indicaciones:

- Niños a partir de los 9 meses hasta los 55 años: Especialmente recomendada para aquellos con mayor riesgo de infección meningocócica, como personas con deficiencias en el complemento, uso de inhibidores del complemento, asplenia funcional o anatómica, y personas con VIH.
- Adolescentes de 11 a 12 años: Se recomienda una dosis inicial, seguida de una dosis de refuerzo a los 16 años.
- Personas en riesgo: Incluyendo aquellos expuestos a brotes de la enfermedad.

Esquema:

- Niños de 9 meses a 23 meses: Dos dosis, con un intervalo de 3 meses entre ellas.
- Niños mayores de 2 años y adultos: Dos dosis, con un intervalo de 2 meses entre ellas.
- Refuerzo: Para personas con riesgo prolongado, se recomienda una dosis de refuerzo 3 años después de la serie primaria si se completó antes de los 7 años, y cada 5 años si se completó a partir de los 7 años.



7ma ave 7-21
zona 1 Huehuetenango



Tel: 3404-9600

Vacuna para el Neumococo

Protégé contra las infecciones causadas por la bacteria *Streptococcus pneumoniae* (neumococo). Esta bacteria puede causar enfermedades graves como neumonía, meningitis y sepsis.

Indicaciones:

- Niños menores de 18 años:
- Adultos de 65 años o más: Si no han recibido previamente una vacuna conjugada o si su historial de vacunación es desconocido.
- Adultos de 19 a 64 años con ciertas condiciones médicas o factores de riesgo, como enfermedad renal crónica, inmunocompromiso, entre otros.



Esquema:

- Niños menores de 2 años: 4 dosis (2, 4, 6 meses y 12-15 meses).
- Niños de 2 a 5 años: 1 dosis si no recibieron las dosis recomendadas cuando eran más pequeños.
- Adultos de 19 a 64 años con condiciones médicas o factores de riesgo: 1 dosis de PCV20 o PCV15 seguida de una dosis de PPSV23.
- Adultos de 65 años o más: 1 dosis de PCV20 o PCV15 seguida de una dosis de PPSV23



7ma ave 7-21
zona 1 Huehuetenango



Tel: 3404-9600

Gardasil 9

Es una vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). Protege contra los tipos de VPH que causan cáncer cervical, vulvar, vaginal y anal, así como verrugas genitales.



Indicaciones:

- Niñas y mujeres de 9 a 26 años
- Niños de 9 a 15 años

Esquema: Tres dosis:

- La primera dosis
- Segunda dosis 2 meses después de la primera
- Tercera dosis 6 meses después de la primera



7ma ave 7-21
zona 1 Huehuetenango



Tel: 3404-9600

Vacuna Pentavalente

También conocida como vacuna quíntuple, es una vacuna combinada que protege contra cinco enfermedades graves. Estas enfermedades son: Tosferina, Difteria, Tétanos, Haemophilus influenzae tipo B (HiB) y Hepatitis B.

Esquema:

La vacuna Pentavalente se administra en cuatro dosis:

- Primera dosis: a los 2 meses de edad.
- Segunda dosis: a los 4 meses de edad.
- Tercera dosis: a los 6 meses de edad.
- Cuarta dosis: a los 18 meses de edad

Indicaciones:

- **Niños menores de 7 años:** Protege contra cinco enfermedades graves, por lo que es parte del calendario de vacunación infantil.
- **Recién nacidos:** Deben iniciar el esquema a los 2 meses de edad.
- **Niños sin esquema de vacunación completo:** Pueden recibir dosis adicionales para completar la serie, según las recomendaciones médicas.



7ma ave 7-21
zona 1 Huehuetenango



Tel: 3404-9600

Vacuna contra la Rotavirus

Protege contra las infecciones por rotavirus, que son la causa principal de diarrea grave en los niños pequeños.



Indicaciones:

Se administra por vía oral y requiere dos o tres dosis. Debe administrarse a partir de las seis semanas de edad. Debe administrarse junto con la lactancia materna, el lavado de manos, el agua limpia y un mejor saneamiento.

Esquema:

- 1era. dosis : 2 meses/6 a 12 semanas
- 2da. dosis 4 meses/10 a 22 semanas
- 3era. dosis 6 meses/14 a 32 semanas



7ma ave 7-21
zona 1 Huehuetenango



Tel: 3404-9600

Vacuna Triple Viral (SPR)

Protege contra tres enfermedades virales: sarampión, paperas y rubéola.



Indicaciones:

Se administra mediante inyección subcutánea a todo niño que cumpla su primer años de vida

Esquema:

- 1era. Dosis 12 meses de edad
- 2da. Dosis a los 6 años de edad o al ingresar a la escuela primaria
- También puede administrarse a adultos no vacunados o sin comprobante de vacunación



7ma ave 7-21
zona 1 Huehuetenango



Tel: 3404-9600

Vacuna Tetravalente

Vacuna contra Difteria, Tétanos,
Tos Ferina, Poliomielitis (IPV).



Indicaciones:

- Primovacunación y dosis de refuerzo para lactantes y niños a partir de los 2 meses de edad.
- Vacunación de refuerzo en los niños de 4 a 13 años de edad, independientemente del esquema de vacunación que haya recibido en el primer año de vida.

Esquema:

- 1era. dosis a los 2 meses de edad
- 2da. Dosis a los 4 meses de edad
- 3era. Dosis a los 6 meses de edad
- 1er. Refuerzo entre los 11 a 18 meses de edad
- 2do. Refuerzo entre los 4 y los 13 años de edad



7ma ave 7-21
zona 1 Huehuetenango



Tel: 3404-9600

Toxoides Diftérico

Protege contra el tétanos y la difteria.
Se administra mediante inyección
subcutánea o intradérmica.



Indicaciones:

- Niños a partir de los 2 meses de edad: Para la primovacunación.
- Refuerzo en niños mayores: Entre los 4 y los 13 años de edad.
- Adultos en riesgo: Según las recomendaciones oficiales

Esquema:

- 1era. dosis a los 2 meses de edad
- 2da. Dosis a los 4 meses de edad
- 3era. Dosis a los 6 meses de edad
- 1er. Refuerzo a los 18 meses de edad
- Refuerzo entre los 4 y los 13 años de edad



7ma ave 7-21
zona 1 Huehuetenango



Tel: 3404-9600

Toxoide Tetánico (TT)

Se utiliza para la prevención específica del Tétanos.



Indicaciones:

- Inmunización activa de refuerzo para la profilaxis del Tétanos
- Prevención del Tétanos neonatal
- Prevención del Tétanos en personas con lesiones sucias o contaminadas, que no han sido vacunadas, o tienen un esquema incompleto o se desconoce

Esquema:

- 1era. dosis a los 2 meses de edad
- 2da. Dosis a los 4 meses de edad
- 3era. Dosis a los 6 meses de edad
- 1er. Refuerzo entre los 11 a 18 meses de edad
- 2do. Refuerzo entre los 4 y los 13 años de edad
- Durante el embarazo en mujeres sin inmunización presedente



7ma ave 7-21
zona 1 Huehuetenango



Tel: 3404-9600

Vacuna Varivax

Es una vacuna que ayuda a proteger a adultos y niños frente a la varicela por Virus de la Varicela



Indicaciones:

vacunación contra la varicela en personas de 12 meses de edad o mayores.

Esquema:

- Los niños de 12 meses a 12 años de edad deben recibir una sola dosis de 0.5 mL
- Los adolescentes de 13 años o mayores y los adultos deben recibir una dosis de 0.5 mL por vía subcutánea en la fecha elegida y una segunda dosis de 0.5 mL cuatro a ocho semanas después



7ma ave 7-21
zona 1 Huehuetenango



Tel: 3404-9600



Clinova

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



7ma ave 7-21
zona 1 Huehuetenango



Tel: 3404-9600